Odos lopo mėginiai: tyrimo eiga

Odos lopo mėginiai padeda nustatyti, ar bėrimą sukelia medžiagos, su kuriomis liečiasi oda.

Prieš tyrimą

Pasakykite gydytojui apie vartojamus vaistus, tepamas priemones ir nugaros odos būklę. Jei įtariate konkretų gaminį, atsineškite jo pakuotę arba sudedamųjų dalių sąrašą.

Kaip atliekamas tyrimas?

Nedideli tiriamųjų medžiagų kiekiai specialiais pleistrais užklijuojami ant nugaros. Pleistrai paprastai paliekami apie 48 valandas.

Kaip prižiūrėti tiriamą vietą?

Kol pleistrai priklijuoti, nešlapinkite nugaros ir venkite veiklos, dėl kurios gausiai prakaituotumėte. Dėl tiriamos vietos priežiūros nuėmus pleistrus laikykitės klinikos nurodymų.

Kada sužinosite rezultatą?

Gydytojas įvertina odos reakcijas per kelis vizitus. Kai kurios reakcijos išryškėja vėliau, todėl gali reikėti papildomo vertinimo. Tikslų vizitų grafiką pateikia klinika.

Ką reiškia teigiama reakcija?

Gydytojas įvertina, ar medžiaga, į kurią sureagavo oda, galėjo sukelti jūsų bėrimą. Aptariama, kur su šia medžiaga galite susidurti ir kaip jos vengti.

Šaltinis: Britų dermatologų asociacija, „Patch testing“